

## ***Richtlijn liquor-afname bij patienten verdacht voor de ziekte van Jakob-Creutzfeldt***

Er zijn landelijke preventieve maatregelen opgesteld voor het omgaan van lichaamsmateriaal bij een patient met CJD

Twee zaken zijn hierbij belang

### **1. Patientcategorieën**

*Categorie 1:* patient bij CJDS of vCJD is vastgesteld.

*Categorie 2:* patienten verdacht voor CJD. Patienten met een onverklaard neurologisch lijden, dat tenminste 2 van de volgende ziekteverschijnselen omvat: progressieve dementie, myoclonieën, ataxie.

*Categorie 3:* personen die een risico lopen op CJD of vCJD.

#### Risico op CJD

geopereerd met instrumenten eerder gebruikt bij een CJD patient, patient ooit behandeld met menselijk groeihormoon, duraplastiek geïmplanteerd, of bij wie prionziekte in de familie voorkomt.

Risico op vCJD: geopereerd met instrumenten eerder gebruikt bij vCJD patient, bloed of ander weefsel ontvangen van vCJD patient.

### **2. Besmettingsrisico weefsels en vloeistoffen (belangrijk voor de neuroloog):**

Weefselklasse A (hoog besmettingsrisico)

Weefselklasse B (laag besmettingsrisico)

Weefselklasse C (niet-detecteerbaar besmettingsrisico)

Dura mater : A, **Liquor: B**, Bloed/bloedstolsel: C

### ***Maatregelen bij lumbaalpunctie:***

- Punctie uitgevoerd door ervaren arts
- Absorberend wegwerfpafdekmatje ligt onder de punctieplaats om eventueel gemorste liquor op te vangen
- Steriele wegwerphandschoenen
- Beschermende bril
- Wegwerp vochtontoelaarbaar schort
- Chirurgisch mondneusmasker

### ***Transport van liquor***

Eerst verpakken in een plastic zak

De afgesloten plastic zak vervolgens in een kunststof container, welke lekdicht wordt afgesloten

Sticker met biohazard teken en vermelding “potentieel CJD besmet materiaal” aan buitenzijde container plakken

***Reïgen gemorst materiaal***: met tissues opdeppen, daarna reinigingsmiddel en vervolgens desinfectie van de plaats met chloor ppm.